

Variables	Bypass infrainguinal (NSQIP 2005-2011)			P
	No fumadores (n=9920), N° (%)	Fumadores (n=6614), N° (%)	Total (n=16534) N° (%)	
ICM	5308 (53,5)	3512 (53,1)	8820 (53,3)	0,61
Nivel del bypass				<0,001
Poplíteo	5177 (52,2)	4373 (66,1)	9550 (57,8)	
Tibial	4743 (47,8)	2241 (33,9)	6984 (42,2)	
Tipo de injerto				0,001
Vena	6856 (69,1)	4393 (66,4)	11249 (68,0)	
Prótesis	3064 (30,9)	2221 (33,6)	5385 (32,0)	
Procedimiento de emergencia	454 (4,6)	288 (4,4)	742 (4,5)	0,50
Especialidad quirúrgica				0,06
Cirugía vascular	9426 (95,0)	6265 (94,7)	15691 (94,9)	
Cirugía general	488 (4,9)	337 (5,1)	825 (5,0)	
Otra	6 (0,1)	12 (0,2)	18 (0,1)	
Anestesia				0,01
General	8797 (88,7)	5980 (90,4)	14777 (89,4)	
Epidural	365 (3,7)	197 (3,0)	562 (3,4)	
Espinal	561 (5,7)	327 (4,9)	888 (5,4)	
Monitoreada	90 (0,9)	58 (0,9)	148 (0,9)	
Regional	94 (1,0)	48 (0,7)	142 (0,9)	
Otra	12 (0,1)	4 (0,1)	16 (0,1)	
Clase ASA				<0,001
Peligro de vida/moribundo	2187 (22,1)	1108 (16,8)	3295 (19,9)	
Participación de residente	6497 (65,7)	4205 (63,8)	10702 (64,9)	0,01
Duración cirugía, min, mediana (RIC)	212 (157-281)	198 (146-267)	206 (152-276)	<0,001